

Vereinsschriften auszutauschen, überreichte die Gesellschaft für die Bibliothek ihre bis dahin erschienenen:

46. Mittheilungen aus dem Osterlande bis zum
1. Hefte des 4. Bandes incl.

Durch Ankauf wurde erworben für die Bibliothek:

47. Nees ab Esenbeck *Hymenopterorum ichneumonibus affinium monographias.* Vol. I. II. Stuttgart,
et. Tüb. 1834.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

Verzeichniss böhmischer Käfer.

Vom Herrn Regierungs rath Schmidt zu Stettin.

(Fortsetzung von No. 2. Seite 28.)

Cantharis vesicatoria Linn. — *Asclera viridissima* Fabr. — *Oedemera podagrariae* Linn. — *marginata* Fabr. — *virescens* Linn. — *clavipes* Fabr. — *lurida* Marsh. — *Spermophagus cardui* Stev. — *Brachytarsus varius* Fabr. — *Apoderus coryli* Linn. — *Rhynchites minutus* Herbst. — *nanus* Payk. — *Apion craccae* Herbst. — *viciae* Payk. — *varipes* Schüpp. — *apricans* Herbst. — *flavipes* Fabr. — *frumentarium* Fabr., Schönh. — *humile* Schüpp. — *ervi* Ghl. — *sorbi* Fabr. — *Cneorhinus coryli* Linn. — *cervinus* Fbr. — *Sciaphilus muricatus* Fabr. — *Brachyderes incanus* Linn. — *Eusomus ovulum* Illig. — *Chlorophanus viridis* Linn. — *Sitona lineatus* Linn. — *lineellus* Linn. — *sulcifrons* Thunb. — *Polydrusus cervinus* Linn. — *micans* Fabr. — *Metallites mollis* Germ. — *atomarius* Oliv. — *ambiguus* Schönh. — *Liophloeus Schmidtii* Schönh. — *Barynotus Bohemanni* Ghl. — *lepidotus* Herbst. — *mercurialis* Fabr. — *Lepyrus binotatus* Fabr. — *Hylobius abietis* Linn. — *pinastri* Herbst. — *Molytes germanus* Linn. — *Hypera punctata* Fabr. — *meles* Fabr. — *Phyllobius pyri* Linn. — *prasinus* Oliv. — *arborator* Herbst. — *psytacinus* Zenck. Germ. — *argentatus* Linn. — *viridi-*

collis Fabr. — *Trachyphloeus scabriculus* Linn. —
Otiorhynchus niger Clairy. — *tenebricosus* Hbst. —
unicolor Herbst. — *hirticornis* Herbst. — *ligustici*
 Linn. — *ovatus* Linn. — *Pissodes pini* Linn. —
fulvofasciatus nob. — *Magdalalis frontalis* Ghl. —
Dorytomus tremulae Payk. — *pectoralis* Fabr. —
majalis Payk. — *Anthonomus rubi* Herbst — *Tychius*
piciroftris Fabr. — *Orchestes bifasciatus* Fabr. —
decoratus Schüpp., Germ. — *stigma* Germ. — *fagi*
 Linn. — *Coeliodes epilobii* Payk. — *didymus* Fabr. —
Ceutorhynchus nigrinus Marsh. — *blandus* nob. —
alauda Fabr. — *floralis* Payk. — *obsoletus* Schüpp.,
 Germ. — *Rhytidosomus globulus* Herbst. — *Cionus*
scrophulariae Linn. — *hortulanus* Marsh. — *Gymnetron*
campanulae Linn. — *plagiellus?* Schönh. — *Ca-*
landra granaria Linn. — *Rhyncolus chloropus* Fbr. —
Tomicus typographus Linn. (*ectudentatus* Payk.) —
laticis Fabr. — *calligraphus* Duftschm. (*curvidens*
 Germ.) — *Cis politus* Illig. — *micans* Fabr. — *Ce-*
rylon histeroides Fabr. — *Bitoma crenatum* Hellw. —
Spondylis buprestoides Linn. — *Isarthron luridum*
 Fabr. — *Callidium violaceum* Linn. — *Clytus*
arietis Linn. — *rhamni* Germ. — *Obrium brunneum*
 Fabr. — *Necydalis minor* Linn. — *Exocentrus*
balteatus Fabr. — *Saperda carcharias* Linn. —
Oberea oculata Linn. — *Rhagium inquisitor* Linn.
 Fabr. — *indagator* Fabr. — *Toxotus cursor* Linn. —
Pachyta quadrimaculata Linn. — *virginea* Linn. —
collaris Linn. — *octomaculata* Fabr. — *sexmaculata*
 Linn. — *Strangalia armata* Herbst. (*calcarata* et *sub-*
spinosa Fabr.) — *Stenura quadrifasciata* Linn. — *me-*
lanura Linn. Fabr. — *Leptura limbata* Laich. (*cincta*
 Fabr.) — *sanguinolenta* Linn. — *maculicornis* De Geer. —
livida Fabr. — *Grammoptera laevis* Fabr. — *rufi-*
cornis Fabr. — *Donacia discolor* Hoppe. — *Orso-*
daena cerasi Fabr. — *Zeugophora flavicollis* Mrsh. —
Crioceris asparagi Linn. — *cyanella* Linn. — *Hispa*
atra Linn. — *Adimonia tanaci* Linn. — *capreae*
 Linn. — *Galleruca lineola* Fabr. — *Graptodera*
oleracea Linn. — *Crepidodera rufipes* Linn. Illig. —
nitidula Linn. — *helxines* Linn. — *Phyllotreta*
vittula nob. — *Aphthona euphorbiae* Fabr. — *Teino-*
dactyla ochroleuca Marsh. — *campestris* nob. —

(*nasturtii* Ghl. Zett., non Fabr.) — *Timarcha metallica* Fabr. — *Chrysomela goettingensis* Linn. — *opulenta* Fischer. — *lamina* Fabr. — *fucata* Fabr. — *varians* Fabr. — *centaurei* Fabr. — *fastuosa* Linn. — *Oreina laeta* nob. — *Lina populi* Linn. — *tremulae* Fabr. — *cuprea* Fabr. — *Gonyoctena rufipes* De Geer. — *pallida* Linn. — *Spartophila sexpunctata* Fabr. — *Gastrophysa polygoni* Linn. — *Phratora vitellinae* Linn. — *Bromius obscurus* Linn. — *Pachybrachis histrio* Fabr. — *Cryptocephalus variabilis* Fabr. — *coryli* Linn. — *Moraei* Linn. — *sericeus* Linn. — *violaceus* Fabr. — *nitidulus* Fabr. — *geminus* Meg. — *vittatus* Fabr. — *Coccinella septempunctata* Linn. — *ocellata* Linn. — *bipunctata* Linn. — *quatuordecimguttata* Linn. — *conglobata* Illig. — *Lycoperdina fasciata* Fabr.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber *Trichius fasciatus* Lin., *abdominalis* Dej. und *zonatus* Germ.

von Dr. Schmidt in Stettin.

In der interessanten Abhandlung: Kritische Revisi-
on der Lamellicornia melitophila der Herrn Burmeister
und Schaum in Germars Zeitschrift für die Entomologie
Bd. II. Hft. 2 werden in der Gattung *Trichius*, Unter-
gattung H. *Trichius* sens. str. als Arten aufgeführt: *Tr.*
fasciatus Lin., *zonatus* Germ., *succinctus* Pall., *piger*
Fbr., und *bidens* Fbr., von welchen die 3 letztern in
Europa nicht einheimisch sind.

Was die beiden andern europäischen Arten: *Tr.*
fasciatus L. und *zonatus* Germ. anbelangt, so stimmt
das von den beiden Herrn darüber Gegebene und deren
Ansicht über diese Arten wie über ihre Geschlechtsdiffe-
renzen nicht ganz mit den Ergebnissen meiner Unter-
suchungen überein. Ich veröffentliche deshalb meine
Ansichten und wünsche, dass Andere über die obwalten-
den Differenzen nach umsichtiger und ruhiger Prüfung
die Sache zur Entscheidung führen mögen.

Die Data über die Geschlechtsdifferenzen in der
Characteristik der Untergattung *Trichius* p. 408 lauten:
„Eine Geschlechtsdifferenz an den Fühlern zeigt sich